



1 Dosis

A partir de 12 años.



Viales	2 ml
Vía	I.M en deltoides
Dosis	0,3 ml
Edad	> 12 años



2º/8º	10 semanas
Tª ambiente 8º/30º	12 horas
Vial perforado 2º/30º	12 horas

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y VACUNAS



los 5+2	correctos
Paciente	correcto
Vacuna	correcta
Intervalo	correcto
Dosis	correcta
Vía	correcta
Lugar anatómico	correcto
Documentación	correcta

1

REGISTRAR
Cartilla vacunal
Diraya



2


VACUNAR



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID-19 COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5

1



Viales multidosis *
Cada vial tiene un volumen de llenado de 2.25ml para preparar 6 dosis de 0.3 ml
SIN DILUIR

2




Atemperar el vial fuera del frigorífico. Mezclar suavemente los viales invirtiendoles 10 veces antes de su uso.
NO AGITAR

3



La vacuna debe tener el aspecto de una dispersión entre blanca y blanquecina sin partículas visibles. No utilice la vacuna si presenta partículas visibles o un cambio de color

4



Desinfectar el tapón del vial con alcohol de 70º o clorhexidina 2% y dejar secar

5



Extraer 6 jeringas de 0.3ml
SIN DILUIR

6



Anotar la hora de la apertura del vial. Administrar vía intramuscular, con aguja 23G



*Si después de extraer las 6 dosis del vial, se pueden extraer dosis adicionales de 0,3 ml, emplearlas todas.

Muy recomendable el empleo de jeringas de bajo espacio muerto para extraer las dosis.

Se recomienda usar la misma aguja para extraer y administrar cada dosis.

Si se cambia de aguja para la inyección, introducir pequeña cantidad de aire antes de retirar la primera aguja para evitar pérdidas de producto por cambio de aguja.

Desechar viales, jeringas y agujas en contenedor de residuos sanitarios.

