




1 Dosis A partir de los 12 años

Viales 2,5 ml
Vía I.M en deltoides
Dosis 0,5 ml
Edad ≥ 12 años



-15°/-50°	9 meses
2°/8°	30 días
Tª ambiente 8°/25°	24 horas
Vial perforado 2°/30°	19 horas

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y VACUNAS



los **5+2** correctos

Paciente **correcto**

Vacuna **correcta**

Intervalo **correcto**

Dosis **correcta**

Vía **correcta**

Lugar anatómico **correcto**

Documentación **correcta**

1 REGISTRAR

Cartilla vacunal
Diraya



2 VACUNAR



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID-19 SPIKEVAX BIVARIANTE ORIGINAL/ÓMICRON BA.4-5 (MODERNA)

1




Viales multidosis
Cada vial contiene 2.5 ml de líquido vacunal, para preparar **5 dosis.***

2




Se debe dejar que el vial refrigerado entre 2 y 8 °C alcance la temperatura ambiente.
Girar suavemente el vial varias veces manteniéndolo vertical, sin voltear ni agitar. Repetir ese movimiento antes de extraer cada una de las dosis.

3



Antes de abrir el vial, la vacuna se presenta como una solución blanca o blanquecina que puede contener partículas blancas o transparentes. Si la vacuna ha cambiado de color o contiene otras partículas debe desecharse.

4



Desinfectar el tapón del vial con alcohol 70° o clorhexidina 2% y dejar secar.
Extraer **5 jeringas*** con 0,5 ml del vial.

5




Anotar la fecha y hora de la apertura

6



Administrar por vía IM en deltoides, con aguja 23G



*** Si del vial se obtiene alguna dosis mas emplearla.**

Se recomienda usar la misma aguja para extraer y administrar cada dosis.

Si se cambia de aguja para la inyección, introducir pequeña cantidad de aire antes de retirar la primera aguja para evitar pérdida de producto por cambio de aguja.

Desechar viales, jeringas y agujas en contenedor de residuos sanitarios.

i