

LISTADO DE VERIFICACIÓN VACUNAL COVID-19 COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5

ANTES DE LA VACUNACIÓN	
El material necesario para la vacunación está preparado	1 2 3
El material para una actuación de emergencia está accesible y en condiciones para ser utilizado	1 2 3
La temperatura del frigorífico se ha mantenido entre 2 y 8 °C	1 2
Viales sin reconstituir no llevan en el frigorífico más tiempo de lo indicado por el fabricante (COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 - 10 semanas)	1 2
Revisar caducidad e inspección ocular del estado de la vacuna	1
Viales multidosis. SIN DILUIR . Cada vial tiene un volumen de llenado de 2.25ml para preparar 6 dosis de 0.3 ml	1
No mantener jeringa cargada más de 12 horas	1 2
Identificación Inequívoca de la persona a vacunar: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Edad, NUHSA (1º Correcto)	2 3
Estado vacunal COVID 19: dosis administradas previamente según carnet vacunal y módulo de vacuna Diraya	3
Anamnesis: reacciones a dosis anteriores, problemas activos de Hª Salud Digital, contraindicaciones, limitaciones y precauciones (Tabla 1 y 2)	2 3
Verificar intervalo de 5 meses de vacuna anterior (3º Correcto)	2 3
Consentimiento informado (si es necesario)	1 2 3
Registro de efectos adversos a dosis anterior en el módulo informático . Notificación de reacciones adversas según indicaciones y canales establecidos	3

DURANTE LA VACUNACIÓN	
La vacuna a administrar contiene los antígenos que se precisa según campaña vacunal (2º Correcto)	1 2
La dosis es la adecuada según fabricante (COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5: 0,3ml) (4º Correcto)	1 2
Información sobre el procedimiento que vamos a seguir	2
Registro de la vacuna a administrar en Diraya (Nombre, Laboratorio, Lote, Caducidad y Fecha de administración) y en cartilla vacunal (7º Correcto)	3
Higiene de manos	1 2
Estado del envase y aspecto del contenido de la vacuna	1
Elección de la vía adecuada para vacunar (IM) (5º Correcto) y tamaño de aguja más adecuado (23G (azul) o 25G (naranja))	2
Elección adecuada del lugar anatómico (deltoides brazo no dominante) (6º Correcto)	2
Utilización de técnica que minimice el dolor producido por la administración parenteral	2
Eliminación adecuada de residuos en contenedores de residuos sanitarios	2

DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN	
Seguimiento inmediato. Observación durante 15 minutos por si aparecen reacciones adversas inmediatas que requieran atención rápida. En personas con antecedente de alergia grave (anafilaxia) de cualquier origen, o reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia administrada por vía intramuscular: esperar 30 minutos	1 2 3
Informar de signos de alarma y posibles efectos secundarios	2 3
Informar de los cuidados y pautas de actuación ante efectos secundarios	2 3



- EQUIPO VACUNADOR**
- 1 Enfermera Prepara Vacuna
 - 2 Enfermera Administra Vacuna
 - 3 Enfermera Registra Vacuna

SEGURIDAD Y VACUNAS




TABLA 1. CONTRAINDICACIONES

Reacción de hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) o reacción alérgica inmediata a cualquiera de las vacunas disponibles, o a algún componente de la vacuna, incluido el polisorbato, o el polietilenglicol.

TABLA 2. LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

Vacunar cuando mejore clínicamente si enfermedad aguda infecciosa moderada o grave.
Autorizado su empleo para mayores de 12 años.
Se puede coadministrar con otras vacunas en caso de estar indicadas.

NUEVA VACUNA COVID OTOÑO 2022