

CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID-19

BIMERVAX®(HIPRA) XFG. 1.1



1 Dosis

Vía **I.M en deltoides**

Dosis **0,5 ml**

Edad autorización **> 12 años**

2º/8º
12 meses *

Tª ambiente <25º
Máximo 24h

- Mantener en el embalaje exterior;
- Proteger de la luz; No congelar

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y VACUNAS

los **5+2** correctos

Paciente **correcto**

Vacuna **correcta**

Intervalo **correcto**

Dosis **correcta**

Vía **correcta**

Lugar anatómico **correcto**

Documentación **correcta**

1 REGISTRAR

2 VACUNAR




1

Jeringa precargada de 0.5 ml refrigerada entre 2 y 8 ° C.

2

Girar suavemente (no agitar) Comprobar la integridad del cierre.

3




Inspeccionar la emulsión (debe ser blanca y homogénea).



No administrar si presenta: partículas, decoloración y/o daños en la jeringa.

4




- Retirar la cápsula de cierre en sentido antihorario.
- Acoplar una aguja de bioseguridad estéril girándola en sentido horario.
- Comprobar que queda firmemente fijada.

5



Destapar la aguja justo antes de administrar, por **vía intramuscular en músculo deltoides**.



* La vacuna deberá conservarse, con el embalaje exterior para protegerlo de la luz, en frigorífico, entre 2°C y 8°C, donde podrá conservarse durante 1 año.

El lugar preferente de administración es el músculo deltoides (parte superior del brazo).
No administrar por vía: Intravascular, subcutánea y/o intradérmica.

La zona de inyección debe estar claramente visible y accesible, y no necesita limpieza a menos que esté visiblemente sucia. Si se necesita limpieza se realizará con agua o suero salino y secado posterior de la zona. No es necesaria la desinfección de la piel.

Desechar viales, jeringas y agujas en contenedor de residuos sanitarios.