

ANTES DE LA VACUNACIÓN *	
El material necesario para la vacunación está preparado	1 2 3
El material para una actuación de emergencia está accesible y en condiciones para ser utilizado	1 2 3
La temperatura del frigorífico se ha mantenido entre 2 y 8 °C	1 2
Viales sin reconstituir no llevan en el frigorífico más tiempo de lo indicado por el fabricante (Pfizer 5 días)	1 2
Revisar caducidad e inspección ocular del estado de la vacuna	1
Diluir vial según fabricante (Pfizer: 1,8 ml S. Fisiológico, mezclar sin agitar, extraer 6 dosis de 0,3 ml en jeringas independientes de escala 0,1)	1
No mantener la dilución en jeringa más de 6 horas	1 2
Identificación Inequívoca de la persona a vacunar: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Edad, NUHSA (1º Correcto)	2 3
Estado vacunal COVID 19: dosis administradas previamente según carnet vacunal y módulo de vacuna Diraya	3
Anamnesis: reacciones a dosis anteriores, problemas activos de Hª Salud Digital, contraindicaciones, limitaciones y precauciones (Tabla 1 y 2)	2 3
Verificar intervalos entre las dos dosis de la misma vacuna, según fabricante (Pfizer 21 días) o de otras vacunas (7 días) (3º Correcto)	2 3
Consentimiento informado (si es necesario).	1 2 3
Registro de efectos adversos a dosis anterior en el módulo informático . Notificación de reacciones adversas según indicaciones y canales establecidos	3

DURANTE LA VACUNACIÓN *	
La vacuna a administrar contiene los antígenos que se precisa según campaña vacunal (2º Correcto)	1 2
La dosis es la adecuada según fabricante (Pfizer: 0,3 ml) (4º Correcto)	1 2
Información sobre el procedimiento que vamos a seguir	2
Registro de la vacuna a administrar en Diraya (Nombre, Laboratorio, Lote, Caducidad y Fecha de administración) y en cartilla vacunal (7º Correcto)	3
Higiene de manos	1 2
Estado del envase y aspecto del contenido de la vacuna	1
Elección de la vía adecuada para vacunar (IM) (5º Correcto) y tamaño de aguja más adecuado (23G)	2
Elección adecuada del lugar anatómico (deltoides brazo no dominante) (6º Correcto)	2
Utilización de técnica que minimice el dolor producido por la administración parenteral	2
Eliminación adecuada de residuos en contenedores de residuos sanitarios	2

DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN *	
Seguimiento inmediato. Observación durante 15 minutos por si aparecen reacciones adversas inmediatas que requieran atención rápida. En personas con antecedente de alergia grave (anafilaxia) de cualquier origen, o reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia administrada por vía intramuscular: esperar 30 minutos.	1 2 3
Informar de signos de alarma y posibles efectos secundarios	2 3
Informar de los cuidados y pautas de actuación ante efectos secundarios	2 3
Citar para la segunda dosis a los 21 días	3



- * EQUIPO VACUNADOR**
- 1 Enfermera Prepara Vacuna
 - 2 Enfermera Administra Vacuna
 - 3 Enfermera Registra Vacuna

SEGURIDAD Y VACUNAS



TABLA 1. CONTRAINDICACIONES

Reacción de hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) o reacción alérgica inmediata a cualquiera de las vacunas disponibles, o a algún componente de la vacuna, incluido el polisorbato, o el polietilenglicol.

TABLA 2. LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Enfermedad aguda infecciosa moderada o grave
- No recomendada en el embarazo
- Mujeres que buscan embarazo: dejar pasar 2 semanas después de la 2ª dosis
- No recomendada en <16 años
- No coadministrar con otro tipo de vacuna. Dejar al menos 7 días entre cualquier vacuna y la de Covid-19