

Presentación del Calendario de Vacunaciones de Andalucía 2024. Novedades y aspectos prácticos.



Marta Bernal. Enfermera. Centro de Salud Las Letanías. Sevilla.
Servicio de Prevención de la DGSP y OF de la Consejería
de Salud y Consumo de Andalucía.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024



Buscar ...



Acerca de

Noticias

Campañas

Recomendaciones

Coberturas vacunales

Profesionales

faq



Preguntas Frecuentes



Banco de preguntas frecuentes sobre vacunas y el proceso de vacunación en Andalucía



<https://www.andavac.es/preguntas-frecuentes/>



Consejería de Salud y Consumo
Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica



Lo más consultado

Campaña Gripe-COVID
Andalucía 2023-24

#StopBronquiolitis

Calendario 2023

Calendarios acelerados 2023

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024



Preguntas Frecuentes

Banco de preguntas frecuentes sobre vacunas y el proceso de vacunación en Andalucía

Escriba palabras clave (separadas por comas) para encontrar respuestas concretas



También puede navegar a través de las categorías que aparecen abajo para encontrar lo que está buscando.

SELECCIONE VACUNA

COVID-19

GRIPE

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

HEPATITIS A

HEPATITIS B

SELECCIONE SITUACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

CONSERVACIÓN DE VACUNAS

CALENDARIOS ACELERADOS

CONVIVIENTES

TRABAJADORES

¿Que preparado habría que administrar frente a meningococo ACWY a los 12 meses?



1 dosis de MeningococoACWY (**Menquadfi**[®]) a partir de Marzo.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

VACUNA MENQUADFI®



Disponible en Marzo 2024

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

VACUNA MENACWY



Menquadfi® (Sanofi) →

Dosis 0.5 ml
Vía IM
No hay que reconstituir

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

VACUNA MENACWY



Nimenrix® (Pfizer)



-4 meses
-GR <12 meses



Menquadfi® (Sanofi)



-12 meses
-12 años (+rescate 13-18 años)
-GR a partir de 12 meses

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

#ZeroMeningitis
que nada te pare

VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO ACWY

Andalucía
2024

NIMENRIX® (PFIZER)



1 dosis
a los **4 meses**



MENQUADFI® (SANOFI)

*Autorizado a partir de los 12 meses



1 dosis
a los **12 meses**



1 dosis
a los **12 años**



(rescate de 13-18 años no vacunados)

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Guía visual de las vacunas empleadas en el Calendario de vacunaciones de Andalucía

ANDALUCÍA

2024

VACUNA EMPLEADA	NOMBRE COMÚN DE LA VACUNA	ENFERMEDADES FRENTE A LAS QUE PROTEGE	EDAD DE ADMINISTRACIÓN RUTINARIA
	BOOSTRIX® (GSK)	Vacuna Tdpa	Tétanos, difteria, tosferina
Embarazadas. Rescate dosis de los 6 años (nacidos antes de 2017)			
	HEXYON® (SANOFI)	Vacuna hexavalente (DTPa-VPI-VHB-Hib)	Tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, enfermedad invasora por Haemophilus influenzae tipo b (meningitis, sepsis, neumonía,...)
2, 4 y 11 meses			
	PREVENAR 13® (PFIZER)	Vacuna del neumococo conjugada 13-valente	Enfermedad por neumococo (13 serotipos): neumonía, meningitis, sepsis. También otitis media aguda en menores de 18 años
2, 4 y 11 meses. Personas de riesgo menores de 18 años*			
	BEXSERO® (GSK)	Vacuna del meningococo B	Enfermedad invasora (meningitis, sepsis, ...) por meningococo B
2, 4 y 15 meses. Personas de riesgo*			
	NIMENRIX® (PFIZER)	Vacuna del meningococo ACWY	Enfermedad invasora (meningitis, sepsis, ...) por meningococos A, C, W e Y
4 meses			
	MENQUADFI® (SANOFI)	Vacuna del meningococo ACWY	Enfermedad invasora (meningitis, sepsis, ...) por meningococos A, C, W e Y
12 meses, 12 años. Rescate de 13 a 18 años. Personas de riesgo*			

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

 <p>M-M-R-VAXPRO® (MSD).</p>	Triple vírica	Sarampión, rubéola y parotiditis (paperas)	12 meses y 3 años. Rescate de 4 a 65 años
 <p>VARIVAX® (MSD).</p>	Vacuna de la varicela	Varicela	15 meses y 3 años. Rescate de 4 a 65 años
<p>TETRAXIM® (SANOFI).</p>	Vacuna DTPa-VPI	Vacuna difteria, tétanos, tosferina acelular de alta carga antigénica, y poliomielitis inactivada	A los 6 años (nacidos a partir de 2017)
 <p>GARDASIL 9® (MSD).</p>	Vacuna del papilomavirus de 9 tipos	Papilomavirus (9 genotipos): verrugas genitales, lesiones precancerosas y cánceres de cuello de útero, vulva, vagina y ano causados por los tipos de VPH de la vacuna,	Chicos y chicas a los 12 años. Rescate en chicas de 13 a 18 años. Rescate chicos 13 años. Personas de riesgo*
<p>APEXXNAR® (PFIZER).</p>	Vacuna del neumococo conjugada 20-valente	Enfermedad invasiva y neumonía por neumococo (20 serotipos).	60 a 73 años. Personas de riesgo de 18 años o más*
 <p>DIFTAVAX® (SANOFI).</p>	Vacuna Td	Tétanos, difteria	14 años (rescate de 15 a 64 años). 65 años (rescate en >65 años)
<p>VAXIGRIP TETRA® (SANOFI).</p>	Vacuna de la gripe tetravalente de huevo	Gripe	6-59 meses y a partir de 60 años Personas de riesgo*
 <p>FLUCELVAX TETRA® (SEQIRUS).</p>	Vacuna de la gripe tetravalente de cultivo celular	Gripe	24-59 meses y a partir de 60 años Personas de riesgo*
<p>EFLUENDA® (SANOFI).</p>	Vacuna de la gripe tetravalente de alta carga antigénica	Gripe	Mayores de 60 años institucionalizadas en residencias. Mayores de 85 años.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Lactante de 4 meses de edad acude a consulta de vacunas, a los 2 meses se le administró 1 dosis de meningococo ACWY de forma privada. ¿ Habría que administrarle una 2ª dosis de meningococo ACWY a los 4 meses?



- **Lactantes que han recibido una dosis de meningococo ACWY antes de los 4 meses:** recibirán la siguiente dosis de vacuna MenACWY (Menquadfi®) a los 12 meses de edad.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

– LOS LACTANTES QUE YA HAN RECIBIDO A LOS 2 MESES DE VIDA LA PRIMERA DOSIS DE VACUNA FRENTE AL MENINGOCOCO ACWY APORTADA POR SUS PADRES, ¿ES NECESARIO QUE RECIBAN LA DOSIS DE LOS 4 MESES QUE APARECE EN EL CALENDARIO 2024?

En este caso, ya no es necesario que reciba esa dosis a los 4 meses.

En la instrucción del calendario de vacunaciones 2024 de Andalucía, una de las principales novedades es la sustitución de la dosis de vacuna frente a meningococo C (Neisvac®) a los 4 meses por una dosis de la vacuna frente a meningococo ACWY Nimenrix®. En las aclaraciones de dicha instrucción se indica que *“Los lactantes que han recibido una dosis de meningococo ACWY antes de los 4 meses, la siguiente dosis de vacuna MenACWY (MenQuadfi®) sería a los 12 meses de edad”*.

La recomendación sanitaria de la autoridad de salud pública, respalda la administración de una sola dosis como primovacunación en estas edades. Este cambio se implanta tras estudios en los que se ha comprobado que un esquema de primovacunación 1+1 (una en primeros meses de vida y otra a los 12 meses) induce una buena respuesta inmunitaria para los meningococos A, C, W e Y.

En este supuesto, se daría por bien vacunado para su edad con la dosis que ya ha recibido, y no precisaría la dosis de los 4 meses de la vacuna frente a meningococo ACWY que aparece en el calendario a los 4 meses.

- [Calendario de Vacunaciones Andalucía 2024.](#)

Fecha de elaboración: 01/02/2024

[Enlace / Compartir](#)

Lactante de 6 meses de edad acude a consulta de vacunas, no se ha puesto vacuna de los 4 meses ¿ Habría que administrarle una dosis de meningococo ACWY ?



- Si, se les administrará la vacuna frente a **meningococo ACWY (Nimenrix®)** a los lactantes nacidos antes del 1 de Octubre y que no hayan recibido aún ni la vacuna del meningococo C ni la del meningococo ACWY.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Si este niño tiene 11 meses y aún no ha recibido ninguna dosis ni de MNC ni de MNACWY ¿ Qué vacuna frente al meningococo ACWY habría que administrarle ? ¿Y con qué intervalo?



- Se le administrará la vacuna frente al **Meningococo ACWY (Nimenrix®)** a los 11 meses y debe haber un intervalo mínimo de 2 meses con la siguiente dosis, que se empleará la vacuna **Menquadfi®** a partir de Marzo.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Niño de 3 años procedente de Perú , acude a consulta de vacunas no ha recibido ninguna dosis frente al Meningococo. ¿Qué Vacuna se administra ?



Personas nacidas entre **2013 y 2019** que no hubieran recibido la dosis de MenC de los **12 meses**. Para el rescate de dicha dosis, se empleará la vacuna MenACWY (**Menquadfi[®]**) en vez de vacuna MenC.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Calendario de Vacunaciones de Andalucía | 2024

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES

- **Personas nacidas entre 2013 y 2019 que no hubieran recibido la dosis de MenC de los 12 meses.** Para el rescate de dicha dosis, se empleará la vacuna MenACWY (Menquadfi®) en vez de vacuna MenC.
- **Lactantes que han recibido una dosis de meningococo ACWY antes de los 4 meses:** recibirán la siguiente dosis de vacuna MenACWY (Menquadfi®) a los 12 meses de edad.
- **Más aclaraciones y situaciones especiales en la sección de FAQs de Andavac:** <https://www.andavac.es/preguntas-frecuentes/>

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

El niño del caso anterior, tampoco tiene ninguna dosis frente al Meningococo B ¿ Se puede administrar esta vacuna de forma financiada?



No . Esta vacunación comenzó en Andalucía el 1 de diciembre de 2021 y está financiada para los nacidos a partir **del 1 de octubre 2021.**

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Calendario de Vacunaciones de Andalucía | 2024

Esta vacunación comenzó en Andalucía el 1 de diciembre de 2021 y está reservada para los nacidos a partir del 1 de octubre 2021.

Aquellos con esquema incompleto o no comenzado, deben completar la pauta según la edad de inicio:

si se inicia de 6 a 11 meses de edad, se recomienda pauta de 3 dosis (2 dosis separadas por al menos 2 meses, y una dosis de refuerzo entre los 12 y los 23 meses con, al menos, una separación de 8 semanas respecto a la dosis previa);

si se inicia de 12 a 23 meses, pauta de 3 dosis (2 dosis separadas por al menos 2 meses, y una dosis de refuerzo a los 12-23 meses de la última dosis);

si ya ha superado los 24 meses, 2 dosis separadas por al menos 2 meses.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Niño varón de 13 años de edad (2011) acude a ponerse 2ª dosis de VPH a su centro de salud. ¿Habría que administrársela?



En aquellos casos que estuvieran citados para la segunda o tercera dosis, se les explicará el paso a pauta de 1 dosis, y no se le administrará dicha dosis.

3.9. Vacunación frente al papilomavirus humano – 12 años

La novedad más relevante es el paso de una pauta de una única dosis de vacuna frente a VPH (Gardasil 9[®]) para las indicaciones aceptadas en el calendario 2024.

Esta estrategia de una dosis es la recomendada actualmente por la OMS, es la que se ha puesto en marcha en países relevantes como Australia y Reino Unido en estas edades, y viene avalada por estudios en los que se observa inmunogenicidad protectora mantenida y eficacia clínica equiparable a las pautas de 2 o 3 dosis en chicas y chicos adolescentes, tras seguimiento de más de 10 años con las vacunas VPH2 y VPH4, y de 3 años con la vacuna VPH9.

En aquellos casos que estuvieran citados para la segunda o tercera dosis, se les explicará el paso a pauta de 1 dosis, y no se le administrará dicha dosis.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Se está realizando vacunación escolar, vamos a vacunar a 2º de la ESO, de vacuna antitetánica (Td), vemos que no tiene vacuna de MnACWY a los 12 años ¿se pueden administrar juntas?.



- Si no tiene administrada 1 dosis **la vacuna MenACWY (Nimenrix[®], Menveo[®] o Menquadfi[®])** después de los 10 años, hay que administrarla.
- Se pueden administrar juntas o con un intervalo de 1 mes por el componente tetánico.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Calendario de Vacunaciones de Andalucía | 2024

ACLARACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES

- **Adolescentes con indicación de vacuna MenACWY que ya han recibido previamente la vacuna MenACWY (Nimenrix®, Menveo® o Menquadfi®).** Si la ha recibido antes de los 10 años, se debe administrar de nuevo una dosis de meningococo ACWY (Menquadfi®).
- **Personas a partir de 6 semanas de vida con factores de riesgo de enfermedad meningocócica por serogrupos ACWY o viajeros a países con alta incidencia (ANEXO 2).** Se recomienda la administración de una pauta especial con la vacuna frente al meningococo ACWY (Nimenrix® en menores de 12 meses; Menquadfi a partir de los 12 meses de edad), según la instrucción vigente específica: [Programa de vacunación frente al meningococo en Andalucía](https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/meningococo-b-y-acwy/) (disponible aquí: <https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/meningococo-b-y-acwy/>).

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Niña nacida en 2018, que acude para recibir la vacuna DTPa-VPI de los 6 años recibe por error la vacuna tdpa ¿qué se debe hacer en estos casos?



Se le debe administrar solo lo que le falta, que en este caso es la poliomielitis.

Se puede administrar en cualquier momento, no es necesario guardar ningún intervalo mínimo de separación.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Tabla 4 Actuación con la dosis de los 6 años con DTPa-VPI o Tdpa durante 2024 en Andalucía.

	ANTECEDENTES	ACTUACIÓN
Nacidos en 2017 o 2018 (deberían haber recibido esquema 2+1: 2, 4 y 11 meses, con vacuna hexavalente)	Si han recibido DTPa-VPI (Tetraxim®)	Están bien vacunados.
	Si no han recibido DTPa-VPI (Tetraxim®)	Deben recibir una dosis. Los nacidos en 2018 la pueden recibir aunque no hayan cumplido los 6 años.
	Si han recibido Tdpa sin polio por error	Deben recibir una dosis de poliomielitis (VPI).
Nacidos antes de 2017 (deberían haber recibido un esquema 3+1: 2, 4, 6 y 18 meses, con vacuna penta o hexavalente)	Si han recibido la dosis de los 6 años de Tdpa sin polio	Están bien vacunados.
	Si no han recibido aún la dosis de vacuna Tdpa de los 6 años	Deben recibir una dosis de Tdpa sin polio (Boostrix®).

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Durante una jornada de vacunación en un centro escolar en 6º de primaria (nacidos en 2012), ¿se puede administrar la vacuna frente al papiloma a chicos con 11 años?



Aunque el inicio de la vacunación sistemática por calendario es a los 12 años, se puede administrar.

La eficacia y la seguridad de esta vacunación en la adolescencia es la misma a los 11 años que a partir de los 12 años. Además, la vacuna Gardasil 9 está autorizada para su uso a partir de los 9 años de edad.

Calendario Vacunaciones Andalucía 2024

Niño que a los 8 años se le administró 1 dosis de Meningococo ACWY (Nimenrix) acude a vacunación de los 12 años. ¿Que vacunas habría que administrarle?.



- Vacuna frente al VPH (**Gardasil 9**®)
- Vacuna Meningococo ACWY (**Menquadfi**®)
- Vacuna frente a la varicela (**Varivax**) si no la ha pasado o no está vacunado con dos dosis.

Muchas Gracias !!!



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

andavac