

EVALUACIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 (COMIRNATY® PFIZER-BIONTECH, SPIKEVAX (MODERNA®) O ASTRAZENECA®)

	PODRÍAN VACUNARSE	PRECAUCIONES	CONTRAINDICACIONES
CONDICIONES	Condiciones	Condiciones	Condiciones
	<ul style="list-style-type: none"> • Personas inmunocomprometidas. • Lactancia. 	<ul style="list-style-type: none"> • En enfermedad aguda moderada o grave y en mastocitosis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguna
	Actuación	Actuación	Actuación
	<ul style="list-style-type: none"> • 15 minutos de observación tras la vacunación. • Personas inmunocomprometidas. La vacuna se considera igual de segura, la respuesta inmune puede ser inferior a lo habitual en población general. • Embarazadas. Se puede valorar el balance beneficio/riesgo en situaciones con alto riesgo de exposición y/o complicaciones. • Lactancia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el riesgo. • Valorar posponer la vacunación. • 15 minutos de observación si finalmente se vacuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica
ALERGIAS	Alergias	Alergias	Alergias
	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedente de alergias NO relacionadas con componentes de la vacuna de COVID-19, otras vacunas o tratamientos inyectables, como: • Alergia a medicamentos orales (incluyendo el equivalente oral de un medicamento inyectable). • Alergias alimentarias, a animales, insectos, venenos, alérgenos ambientales, látex etc. • Antecedentes familiares de alergias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedente de reacción alérgica inmediata a otras vacunas o tratamientos inyectables (diferentes a los componentes de Comirnaty® o Spikevax (Moderna®) o el polisorbato, ya que en estos casos la vacunación está contraindicada). 	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de lo siguiente son contraindicaciones de recibir cualquiera de las dos vacunas de ARNm frente a COVID-19: • Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) tras una dosis previa de cualquiera de las dos vacunas o cualquiera de sus componentes (incluyendo el polietilenglicol). • Reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a una dosis previa de cualquiera de las dos vacunas o cualquiera de sus componentes (incluyendo el polietilenglicol). • Reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a polisorbato.
	Actuación	Actuación	Actuación
	<ul style="list-style-type: none"> • Observación de 30 minutos a las personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves (anafilaxia) por cualquier causa. • Observación de 15 minutos al resto de personas, incluyendo aquellas con antecedentes de reacciones alérgicas no anafilácticas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el riesgo. • Valorar posponer la vacunación. • 30 minutos de observación si finalmente se vacuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • No vacunar. • Derivar para estudio en Servicio de Alergia / Inmunología.

(Tabla adaptada de CDC: <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html>)