LISTADO DE VERIFICACIÓN VACUNAL

COVID-19 VACUNA COMIRNATY® "FORMATO ADULTO" PFIZER & BIONTECH

Prizer & Diunieun	
ANTES DE LA VACUNACIÓN	*
El material necesario para la vacunación está preparado	1 2
El material para una actuación de emergencia está accesible y en condiciones para ser utilizado	1 2 3
La temperatura del frigorífico se ha mantenido entre 2 y 8 °C	1 2
Viales sin reconstituir no llevan en el frigorífico más tiempo de lo indicado por el fabricante (Pfizer 31 días)	1 2
Revisar caducidad e inspección ocular del estado de la vacuna	1
Diluir vial según fabricante (Pfizer: 1,8 ml Cloruro sódico 0,9%, mezclar sin agitar, extraer 6 dosis, o más si es posible, de 0,3 ml en jeringas independientes)	1
No mantener la dilución en jeringa más de 6 horas	12
Identificación Inequívoca de la persona a vacunar: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Edad, NUHSA (1º Correcto)	2 3
Estado vacunal COVID 19: dosis administradas previamente según carnet vacunal y módulo de vacuna Diraya	3
Anamnesis: reacciones a dosis anteriores, problemas activos de Hª Salud Digital, contraindicaciones, limitaciones y precauciones (Tabla 1 y 2)	2 3
Verificar intervalos entre las dos dosis de la misma	

vacuna, según fabricante (Pfizer 21 días) (3º

Consentimiento informado (si es necesario).

Registro de efectos adversos a dosis anterior en el

adversas según indicaciones y canales establecidos

módulo informático. Notificación de reacciones

Correcto)

DURANTE LA VACUNACIÓN	
La vacuna a administrar contiene los antígenos que se precisa según campaña vacunal (2º Correcto)	
La dosis es la adecuada según fabricante (Pfizer: 0,3 ml) (4º Correcto) Información sobre el procedimiento que vamos a seguir	
Higiene de manos	
Estado del envase y aspecto del contenido de la vacuna	
Elección de la vía adecuada para vacunar (IM) (5º Correcto) y tamaño de aguja más adecuado (23G)	
Elección adecuada del lugar anatómico (deltoides brazo no dominante (6º Correcto)	
Utilización de técnica que minimice el dolor producido por la administración parenteral	
Eliminación adecuada de residuos en contenedores de residuos sanitarios	



2 3

3



Enfermera Prepara Vacuna

Enfermera Administra Vacuna

Enfermera Registra Vacuna



12

12

2

3

12

2

2

Consejería de Salud y Familias

2 3

2 3

DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN

Seguimiento inmediato. Observación durante 15 minutos por si aparecen reacciones adversas inmediatas que requieran atención rápida. En personas con antecedente de alergia grave (anafilaxia) de cualquier origen, o reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia administrada por vía intramuscular: esperar 30 minutos.

Informar de signos de alarma y posibles efectos secundarios

Informar de los cuidados y pautas de actuación ante efectos secundarios

Citar para la **segunda dosis a los 21 días**

SEGURIDAD Y VACUNAS



Reacción de hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) o reacción alérgica inmediata a cualquiera de las vacunas disponibles, o a algún componente de la vacuna, incluido el polisorbato, o el polietilenglicol.

TABLA 1. CONTRAINDICACIONES

TABLA 2. LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

Enfermedad aguda infecciosa moderada o grave Se puede administrar en cualquier trimestre del embarazo

Mujeres que buscan embarazo: no es necesario dejar un tiempo desde la vacunación

No recomendada en < 12 años

Se puede coadministrar con otras vacunas en caso de estar indicadas