



1 Dosis
a partir de 18 años

Presentación Jeringa precargada monodosis (0,5 ml)

Vía I.M. en deltoides

Dosis 0,5 ml

Edad ≥ 18 años



-40 °C a -15 °C

Hasta la fecha de caducidad

2 °C a 8 °C

Hasta 30 días (tras descongelación)

Tª ambiente
8 °C a 25 °C

Hasta 24 horas (tras descongelación)



SEGURIDAD DEL
PACIENTE Y VACUNAS

los 5+2 correctos


Paciente	correcto
Vacuna	correcta
Intervalo	correcto
Dosis	correcta
Vía	correcta
Lugar anatómico	correcto
Documentación	correcta



CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE mRESVIA

mRESVIA® DISPERSIÓN INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA
Vacuna de ARNm frente al virus respiratorio sincitial (VRS)


1 Descongelar



Descongelar la jeringa precargada según el tamaño del envase y la temperatura (ver tabla).


Una vez descongelada, no volver a congelar.

2 Inspección visual




La vacuna debe tener el aspecto de una dispersión blanca blanquecina. **No utilice la vacuna si presenta partículas visibles o un cambio de color.**

3 Retirar el capuchón




Sujete la jeringa por el cuerpo y retire el capuchón en línea recta. **No gire el capuchón.**

4 Colocar la aguja



Coloque la aguja en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté firmemente montada.

5 Administrar



NO AGITAR.
Administrar una dosis única de **0,5 ml** por vía intramuscular (I.M.) en el músculo deltoides, utilizando la técnica aséptica habitual. **No inyectar por vía intravenosa, subcutánea ni intradérmica.**

6 Desechar



Desechar la jeringa y la aguja en contenedor de residuos sanitarios.

Tabla 1. Condiciones para descongelar y tiempos de utilización (según el tamaño del envase)

Tamaño del envase	Temperatura de descongelación (en nevera) (°C)	Duración de la descongelación (minutos)	Temperatura de descongelación a temperatura ambiente (°C)	Duración de la descongelación (minutos)
Caja de 1 jeringa precargada	2 – 8	100	15 – 25	40
Caja de 10 jeringas precargadas	2 – 8	160	15 – 25	80
1 jeringa (sacada de la caja)	2 – 8	100	15 – 25	40

Conservación tras la descongelación

2 °C – 8 °C	Hasta 30 días
8 °C – 25 °C	Hasta 24 horas

Durante este tiempo, conservar en el envase original y protegido de la luz.



La vacuna **no debe** mezclarse con otras vacunas ni medicamentos en la misma jeringa.

Utilizar inmediatamente después de quitar el capuchón.

Usar la técnica aséptica habitual.

Seguir las **recomendaciones oficiales de vacunación.**

1 REGISTRAR
Cartilla vacunal · Diraya

2 VACUNAR

