



1 Dosis

Presentación: jeringa precargada

Vía I.M, vasto externo

NO se debe agitar

NO precisa dilución

CONSERVACIÓN

Conservar en nevera entre 2°/8°

No se debe congelar

Tª ambiente 20°/25° máximo 8 horas (protegido de la luz)

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y VACUNAS

los 5+2 correctos

Paciente correcto

Vacuna correcta

Intervalo correcto

Dosis correcta

Vía correcta

Lugar anatómico correcto

Documentación correcta

1

REGISTRAR

Cartilla vacunal

Diraya

2

VACUNAR

RECOMENDACIONES DE EMPLEO DE NIRSEVIMAB (BEYFORTUS®)

PRESENTACIONES

Beyfortus 50 mg:

En jeringa precargada, con émbolo morado.

Contiene 50 mg de nirsevimab en 0,5 ml (100 mg/ml).

Para lactantes con menos de 5 kg de peso.



Beyfortus 100 mg:

En jeringa precargada, con émbolo azul claro.

Contiene 100 mg de nirsevimab en 1 ml (100 mg/ml).

Para lactantes de 5 kg o más de peso.



SE PUEDE ADMINISTRAR JUNTO CON LAS VACUNAS DEL CALENDARIO



FICHA TÉCNICA DE BEYFORTUS®

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/beyfortus-epar-product-information_es.pdf



CAMPAÑA #STOPBRONQUIOLITIS

Prevención de la bronquiolitis por el VRS en lactantes

<https://www.andavac.es/stop-bronquiolitis/>

