Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

# RECOMENDACIONES DE EMPLEO DE NIRSEVIMAB (BEYFORTUS®)

## 1 Dosis

Presentación: jeringa precargada
Vía I.M, vasto externo
NO se debe agitar
NO precisa dilución

## CONSERVACIÓN

Conservar en nevera entre 2º/8º
No se debe congelar
Tª ambiente 20º/25º máximo 8 horas (protegido de la luz)

## SEGURIDAD DEL PACIENTE Y VACUNAS

los 5+2 correctos
Paciente correcto
Vacuna correcta
Intervalo correcto
Dosis correcta
Vía correcta
Lugar anatómico correcto
Documentación correcta

1 REGISTRAR
Cartilla vacunal
Diraya

2 VACUNAR

## PRESENTACIONES

**Beyfortus 50 mg:**
En jeringa precargada, con émbolo morado.
Contiene 50 mg de nirsevimab en 0,5 ml (100 mg/ml).
Para lactantes con menos de 5 kg de peso.

**Beyfortus 100 mg:**
En jeringa precargada, con émbolo azul claro.
Contiene 100 mg de nirsevimab en 1 ml (100 mg/ml).
Para lactantes de 5 kg o más de peso.

**SE PUEDE ADMINISTRAR JUNTO CON LAS VACUNAS DEL CALENDARIO**



**FICHA TÉCNICA DE BEYFORTUS®**
**https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/beyfortus-epar-product-information_es.pdf**

**CAMPAÑA #STOPBRONQUIOLITIS**
**Prevención de la bronquiolitis por el VRS en lactantes**
**https://www.andavac.es/stop-bronquiolitis/**

Versión 2. Fecha de actualización: 11 de septiembre de 2025