

# VACUNACIÓN HERPES ZÓSTER



## VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO

**Se recomienda la vacunación** frente al herpes zóster en:  
Personas de 18 años o más, con **alguna de las siguientes situaciones:**

- ▶ Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), en las siguientes circunstancias:
  - Si han pasado menos de 24 meses desde el TPH.
  - Independientemente desde el tiempo transcurrido del TPH:
    - Si recibe tratamiento inmunosupresor.
    - Si desarrolla enfermedad injerto contra huésped (EICH).
- ▶ Trasplante de órgano sólido (TOS) o en espera del mismo.
- ▶ Tratamiento con fármacos anti-JAK.

## VACUNA

- ▶ Vacuna frente a herpes zóster (Shingrix)

## PAUTA

**Dos dosis**, separadas por al menos 2 meses.

- ▶ En caso de trasplante reciente, se debe esperar para esta vacunación:
  - En caso de TPH autólogo: esperar al menos 3 meses.
  - En caso de TPH alogénico: esperar al menos 6 meses.
  - En caso de TOS: esperar al menos 4 meses.
- ▶ Se puede administrar a la vez que otras vacunas como: COVID-19, gripe no adyuvada, neumococo, tétanos-difteria-tosferina (Tdpa).

Esta vacuna ayuda a prevenir la aparición de episodios de herpes zóster y sus posibles complicaciones.



**Vacúnate en tu  
hospital de referencia**



## PARA MÁS INFORMACIÓN...

- ▶ Consulta a tu profesional de referencia.
- ▶ Visita la web de ANDAVAC <https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/herpes-zoster/>