



NEUMOCOCO - Vacunación en grupos de riesgo

Esquema simplificado del programa de vacunación frente a neumococo en Andalucía

	Personas sanas ¹	Grupo 1 Alto riesgo Inmunocomprometidos	Grupo 2 Alto riesgo Inmunocompetentes	Grupo 3 Riesgo moderado				
				Grupo 3A Patologías crónicas *		Grupo 3B Post-COVID grave, residencias mayores		
				una patología	dos o más patologías			
2 a 23 meses	VNC13 ²	VNC13 ³	VNC13 ³	VNC13 ³	VNC13 ³	VNC13 ⁴		
24 a 59 meses		VNC13 ^{4,5} + 2 dosis de VNP23 ^{6,7}	VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ⁶	VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ⁶	VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ⁶			
5-59 años	-			VNC13 ⁴				
60-64 años	VNC13			VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ⁶			VNC13 ⁴	VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ⁶
65-70 años				VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ^{6,7}			VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ⁶	VNC13 ⁴ + 1 dosis de VNP23 ⁶
> 70 años	-			VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ^{6,7}			VNC13 ^{4,5} + 1 dosis de VNP23 ⁶	VNC13 ⁴ + 1 dosis de VNP23 ⁶

GRUPOS:

GRUPO 1: inmunodepresión, incluido ID primarias, asplenia, VIH, enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, trasplantados, oncohematológicos, insuficiencia renal crónica 4-5, síndrome nefrótico, síndrome de Down.

GRUPO 2: fístula LCR, implante coclear, alcoholismo crónico y cirrosis hepática, fibrosis quística. Antecedente de ENI previa.

GRUPO 3:

Grupo 3A*: enfermedad cardiovascular crónica, otras enfermedades respiratorias crónicas (incluyendo asma moderada-grave que no precise inmunosupresores), enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, enfermedad hepática crónica, enfermedad celíaca, diabetes mellitus, tabaquismo.

Grupo 3B. Antecedente de COVID-19 grave (hospitalización). Personas institucionalizadas en residencias de mayores.

SIGLAS:

VNC13: vacuna neumocócica conjugada 13-valente. (Prevenar 13[®])

VNP23: vacuna neumocócica polisacáridica 23-valente (Pneumovax 23[®]).

NOTAS:

1. Sin patologías o situaciones recogidas en el Grupo 1, 2 y 3.
2. VNC13: pauta según edad de inicio.
3. Pauta de VNC13 según edad de inicio. Pauta 3+1 si se inicia antes de los 6 meses.
4. En mayores de 5 años, siempre pauta de 1 dosis de VNC13 (no administrar si ya la ha recibido previamente).
5. VNC13: De 24 a 59 meses, pauta de dos dosis.
6. VNP23: al menos 12 meses después de VNC13 (intervalo mínimo 2 meses en <18 años).
7. La segunda dosis de VNP23 se administra al menos 5 años después de la primera dosis de VNP23.