

Nueva Información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre los eventos tromboembólicos con la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca



Muy raramente la administración de la vacuna Vaxzevria se puede asociar a la aparición de eventos trombóticos acompañados de trombopenia, en zonas inusuales como los senos venosos cerebrales o las venas esplácnicas y trombosis arterial.



La mayoría de los casos se han presentado en **mujeres de menos de 60 años** en las dos semanas siguientes a la administración de la vacuna. No se han identificado factores de riesgo en los casos conocidos.



Se recomienda **vigilar la posible aparición de signos y síntomas** de eventos trombóticos y trombocitopenia para su diagnóstico y tratamiento precoz. Pueden consultarse las recomendaciones sobre el manejo de un caso sospechoso y el tratamiento en el siguiente enlace: <https://facme.es/>



Informe a los ciudadanos sobre los signos y síntomas por los que deben buscar asistencia médica inmediata.

- **Dificultad para respirar.**
- **Dolor en el pecho.**
- **Hinchazón o dolor frialdad en una pierna.**
- **Dolor abdominal persistente.**
- **Dolor de cabeza intenso y persistente o que empeora más de 3 días después de la vacunación.**
- **Visión borrosa o doble.**
- **Múltiples hematomas pequeños, manchas rojizas o violáceas, en la piel.**