

NEUMOCOCO - Vacunación en grupos de riesgo

Patologías y situaciones de riesgo de enfermedad neumocócica invasora (ENI)

RIESGO DE ENI	PATOLOGÍAS-SITUACIONES
GRUPO 1. RIESGO ALTO INMUNODEPRIMIDOS	 Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de órgano sólido (TOS). Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas: humorales, excluyendo déficit selectivo de IgA, celulares o combinadas, deficiencias del complemento y trastornos de la fagocitosis. Cualquier neoplasia maligna, hematológica u órgano sólido. Infección por VIH. Insuficiencia renal crónica en estadios 4 y 5 de la National Kidney Foundation y síndrome nefrótico. Enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos: Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades reumatológicas, asma grave, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome hemolítico urémico, miastenia gravis, etc. Asplenia anatómica o funcional (disfunción esplénica), incluidas la drepanocitosis y otras hemoglobinopatías graves. Tratamiento con eculizumab.
GRUPO 2. RIESGO ALTO INMUNOCOMPETENTES	 Síndrome de Down. Fístula de líquido cefalorraquídeo. Portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlo. Antecedente personal de haber padecido una enfermedad neumocócica invasora. Alcoholismo crónico y cirrosis hepática. Fibrosis quística.
GRUPO 3. RIESGO MODERADO	 Enfermedad cardiovascular crónica, excluida hipertensión arterial. Otras enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo asma que no precise tratamiento inmunosupresor. Enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, por riesgo de aspiración pulmonar. Enfermedad hepática crónica. Enfermedad celiaca. Diabetes mellitus. Tabaquismo (fumador de al menos un cigarrillo diario). Institucionalizados en residencias de mayores. Antecedente de COVID-19 grave (que precisara ingreso hospitalario).





Servicio Andaluz de Salud

