

VACUNA MENINGOCOCO B Y ACWY



#ZeroMeningitis

VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO

En caso de encontrarte en alguna de estas **situaciones, se recomienda la vacunación** frente al meningococo B y ACWY:

- Asplenia (personas sin bazo o con bazo no funcionando o pendientes de que se lo extirpen).
- Deficiencia de properdina.
- Déficit de complemento.
- Tratamiento con eculizumab.
- Trasplante de médula ósea.
- Antecedente enfermedad meningocócica invasora (sepsis, meningitis).
- Personal de laboratorio (técnicos de laboratorio y microbiólogos) que trabaja con muestras que potencialmente puedan contener meningococo.

Otras indicaciones de la vacuna del **meningococo B**:

- En caso de brote de meningococo B.

Otras indicaciones de la vacuna del **meningococo ACWY**:

- Infección por VIH.
- Viajeros a zonas de riesgo (consultar en un Centro de Vacunación Internacional).
- Contactos cercanos de un caso de EMI por meningococo A, W, Y que no estuvieran previamente inmunizados.

VACUNAS

- Vacuna meningococo B (Bexsero).
- Vacuna meningococo ACWY (Nimenrix).

VACUNACIÓN SISTEMÁTICA

Todos los chicos y chicas se deben vacunar frente al meningococo en los siguientes momentos de la vida:

- **2 meses:** meningococo B.
- **4 meses:** meningococo B y C.
- **12 meses:** meningococo ACWY.
- **15 meses:** meningococo B.
- **12 a 20 años:** meningococo ACWY (1 dosis).



Las vacunas disponibles frente a meningococo previenen fundamentalmente meningitis y sepsis causadas por los meningococos A, B, C, W e Y, que son los más frecuentes en nuestro medio. Ambas enfermedades son muy graves y pueden llevar a la muerte.

**Vacúnate en tu centro de salud.
Pide cita por los canales habituales.**

PARA MÁS INFORMACIÓN...

- Consulta a tu profesional de referencia.
- Visita la web de ANDAVAC <https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/meningococo-b-y-acwy/>

#ZeroMeningitis
que nada te pare