

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППА ИНТРАНАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Вакцина против ДЕТСКОГО ГРИППА:

Грипп может представлять собой серьёзную проблему для здоровья детей в возрасте до 5 лет, поскольку он приводит к большому числу обращений за медицинской помощью в учреждения первичной медико-санитарной помощи, а также к госпитализациям, некоторые из которых бывают тяжёлыми. Схема вакцинации — 1 доза. Дополнительная информация: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

Перед подписанием данного согласия рекомендуем ознакомиться с информацией, содержащейся на обратной стороне этого Документа:

- Почему важно вакцинировать детей в возрасте до 5 лет против гриппа?
- Кто должен вакцинироваться против гриппа?
- Каковы противопоказания к интраназальной вакцине?
- Какие риски связаны с интраназальной вакциной?
- Что делать при появлении каких-либо из этих реакций?
- Почему вакцинация проводится в образовательных учреждениях?
- Где можно получить дополнительную информацию?

Образовательное учреждение: _____ Класс и группа: _____
Имя и фамилия: _____
Дата рождения: Пол: Мужской / Женский
Населённый пункт: Телефон отца/матери/опекуна:

ОПРОСНИК (заполняется отцом, матерью или опекуном).

Имеется ли аллергия на какие-либо лекарственные препараты? ДА / НЕТ В случае утвердительного ответа:
на какие?
Имеются ли проблемы со сниженным иммунитетом, получает ли какой-либо иммунодепрессантный препарат?
ДА / НЕТ
В случае утвердительного ответа: какой препарат и в какой дозе принимает?
Имеется ли тяжёлая аллергия на яйцо? ДА / НЕТ

ВАЖНО: Для проведения вакцинации необходимо Ваше разрешение, обязательна Ваша подпись. После подписания отправьте или передайте этот бланк в образовательное учреждение в указанный срок.

Отметьте в соответствующей графе, согласны ли Вы на вакцинацию Вашего ребёнка.

Г-н / Г-жа Документ, удостоверяющий личность №.....

Действуя от своего имени, а также в качестве отца/матери/законного представителя
ребёнка.....

Я даю согласие на вакцинацию моего ребёнка интраназальной вакциной против гриппа в образовательном учреждении.

Да ☐ Нет ☐

Если учащийся/учащаяся является членом государственной системы взаимного медицинского страхования (MUFACE, MUGEJU или ISFAS) и получает медицинскую помощь у частного поставщика медицинских услуг, необходимо заполнить следующие поля:

НОМЕР ЗАСТРАХОВАННОГО: ПОСТАВЩИК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:

Adeslas ☐ Asisa ☐ Nueva Mutua Sanitaria ☐ Другое ☐

В _____ «__» _____ 2026 года.

ПОДПИСЬ ОТЦА, МАТЕРИ ИЛИ ОПЕКУНА:

МЕСТО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ

Не вакцинирован(а):

☐ По медицинским противопоказаниям ☐ В связи с отказом ☐ В связи с отсутствием ☐ Другое

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА ИНТРАНАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 36 ДО 59 МЕСЯЦЕВ (3 И 4 ГОДА)

Почему важно вакцинировать детей в возрасте до 5 лет против гриппа?

Профилактика играет ключевую роль в защите здоровья детей. Грипп может быть тяжёлым заболеванием у детей в возрасте до 5 лет, вызывая большое количество обращений за медицинской помощью и госпитализаций, некоторые из которых могут быть связаны с тяжёлым течением заболевания.

Кому рекомендуется вакцинация против гриппа интраназальной вакциной в школах и детских образовательных учреждениях?

Вакцинация против гриппа рекомендуется всем детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Интраназальная вакцина показана детям начиная с 2-летнего возраста и включена в программы вакцинации в образовательных учреждениях для детей, посещающих первый и второй циклы дошкольного образования. Эти дети будут вакцинированы против гриппа непосредственно в образовательных учреждениях с использованием интраназальной вакцины Fluenz.

[Инструкция по медицинскому применению по этой ссылке](#)

Какие противопоказания имеет интраназальная вакцина против гриппа?

Интраназальная вакцина против гриппа не подходит для детей, имеющих следующие состояния:

- Тяжёлые аллергические реакции на яйца или продукты из них.
- Серьёзные нарушения работы иммунной системы, врождённые или вызванные медицинским лечением.
- Длительное лечение салицилатами, принимаемыми внутрь или применяемыми местно.
- Недавние эпизоды астмы, особенно если они имели место в течение трёх дней, предшествующих вакцинации.

В этих случаях вакцина должна вводиться внутримышечно в обычном медицинском центре (центре первичной медицинской помощи), который посещает ребёнок.

Кроме того, применение интраназальной вакцины не рекомендуется детям, которые находятся в контакте с лицами с тяжёлым иммунодефицитом, например с реципиентами трансплантатов. Однако крайне важно вакцинировать этих детей для предотвращения передачи инфекции людям с ослабленным иммунитетом, используя внутримышечную вакцину для снижения рисков.

Какие побочные эффекты имеет интраназальная вакцина против гриппа?

Эта вакцина является безопасной и использовалась в различных странах с хорошими результатами. Наиболее распространённой реакцией является заложенность носа, однако также могут наблюдаться другие симптомы, такие как снижение аппетита или общее недомогание. В случае повышения температуры или плохого самочувствия рекомендуется применять парацетамол.

Почему вакцинация против гриппа проводится в образовательных учреждениях?

Облегчение доступа к вакцинации имеет принципиальное значение. Для многих семей посещение медицинского центра в рабочее время представляет сложность, поэтому проведение вакцинации в образовательных учреждениях упрощает этот процесс. Опыт других стран показал, что вакцинация в образовательных учреждениях является эффективной стратегией. Кроме того, введение интраназальной вакцины, которое не вызывает боли, делает её идеальным вариантом для проведения вакцинации в таких условиях.

Где можно получить дополнительную информацию?

Для получения дополнительной информации о кампании по вакцинации детей против гриппа в целом и о школьной вакцинации интраназальной вакциной можно обратиться к следующим источникам:

- На веб-сайте Andavac, посвящённом вакцинации детей против гриппа: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>
- К медицинским работникам, осуществляющим медицинское наблюдение за ребёнком.