

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VACUNACIÓN A LOS 6 AÑOS Y DE 12 A 16 AÑOS EN CENTROS EDUCATIVOS-2026

Las vacunas son muy importantes para la prevención de enfermedades infecciosas y constituyen una de las estrategias de salud pública que mayor beneficio ha producido y continúa realizando para el control y la erradicación de enfermedades infecciosas. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía recomienda las siguientes vacunaciones coincidiendo la edad de vacunación con la edad de los alumnos de algunos cursos escolares. Puede consultar el calendario de vacunaciones actual de Andalucía en esta sección de la página web de Andavac: <https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

CURSO ACADÉMICO	EDAD ESCOLAR	VACUNACIÓN INDICADA PARA SU EDAD	REVISIÓN DE VACUNAS ATRASADAS
1º Primaria	6 y 7 años	DTPa-VPI (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis)	Se aprovechará para revisar el calendario y actualizar vacunas pendientes, como varicela o triple vírica .
6º Primaria	11 y 12 años	Meningococo ACWY y papilomavirus	
ESO (2º)	13 y 14 años	Tdpa (tétanos, difteria, tosferina)	
ESO (3º, 4º)	15 a 16 años	Revisión y actualización de vacunas pendientes	

● Vacuna frente a tétanos, difteria, tosferina, y poliomielitis (DTPa-VPI)

Se administra a los 6 años, en el curso de 1º de Primaria. Corresponde a la dosis de recuerdo de la vacuna frente a la difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis, que se inició a los 2 meses. La pauta es de 1 dosis.

● Vacuna frente al meningococo ACWY

El meningococo es un microorganismo que puede causar meningitis bacteriana y otras enfermedades muy graves. La meningitis puede dejar secuelas en un 30% de casos y llevar al fallecimiento en el 10%. La vacuna protege frente a 4 tipos de meningococo: A, C, W, Y. La pauta es de 1 dosis, a los 12 años.

Más información: <https://www.andavac.es/campanas/meningitis/>

● Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH)

El VPH es un virus que se transmite por vía sexual y es la causa principal del cáncer de cuello de útero. Además, puede causar otras enfermedades como las verrugas genitales y cánceres en otros sitios, como ano, genitales y garganta, tanto en mujeres como hombres. La pauta es de 1 dosis, a los 12 años.

Más información: <https://www.andavac.es/vacunacion-papilomavirus-en-andalucia/>

● Vacuna frente a la varicela

La varicela es una enfermedad viral que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas tipo vesículas que al secarse forman costras. Es muy frecuente, sobre todo en la infancia. Habitualmente tiene un curso benigno, aunque puede llegar a ser grave. Se debe vacunar a estas edades si no se ha pasado la varicela ni ha recibido una pauta completa con dos dosis de la vacuna. La pauta es de 1 o 2 dosis, dependiendo de si tiene puesta una dosis previa. Está contraindicada en inmunodeprimidos.

Más información aquí: <https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

● Vacuna triple vírica

Es una vacuna combinada que protege frente a tres enfermedades virales importantes: sarampión, rubeola y paperas. Se administran dos dosis durante los primeros años de vida. Sin embargo, en caso de que no ha iniciado o completado esa pauta de dos dosis, se debe aprovechar esta visita escolar para su administración.

Está contraindicada en inmunodeprimidos.

Más información aquí: <https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

● Vacuna frente a tétanos y difteria y tosferina (Tdpa)

Se administra a los 13-14 años de edad, en el curso de 2º de ESO. Corresponde a la dosis de recuerdo de la vacuna frente a la difteria, tétanos y tosferina. La pauta es de 1 dosis.

Más información aquí: <https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VACUNACIÓN A LOS 6 AÑOS Y DE 12 A 16 AÑOS EN CENTROS EDUCATIVOS-2026

Todas las vacunas mencionadas han demostrado ser seguras

Como cualquier otro medicamento, pueden producir efectos secundarios. La mayoría de estos son leves, siendo los más frecuentes: enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección, fiebre en las primeras 48 horas y dolor de cabeza. Por otro lado, no debemos olvidar que la administración de cualquier vacuna en adolescentes se asocia con mayor frecuencia a síncope o desmayos. En muy raras ocasiones se produce una reacción anafiláctica.

¿Qué hacer ante alguna de estas reacciones?

- Para la reacción local del brazo se recomienda frío local y antiinflamatorios.
- Si apareciese fiebre, se recomiendan antitérmicos como paracetamol o ibuprofeno.
- Para evitar mareos se recomienda permanecer sentado durante la vacunación y 5-10 minutos después de la administración de la vacuna.

Se recomienda consultar con su profesional sanitario si estas reacciones aumentan de intensidad o duran más de lo habitual.

DATOS DEL NIÑO/A (cumplimentar por el padre, madre o tutor)

Centro escolar: _____ Curso y grupo: _____

Nombre y apellidos: _____

Fecha de nacimiento: ____/____/____ Sexo : ☐ Hombre ☐ Mujer

Localidad: _____ Teléfono del padre, madre o tutor: _____

¿Tiene alergia a algún medicamento? ☐ Si ☐ No En caso afirmativo: ¿a qué? _____

¿Tiene problemas de defensas (defensas bajas), recibe algún tratamiento inmunosupresor? ☐ Si ☐ No

En caso afirmativo: ¿qué fármaco y dosis toma? _____

¿Ha padecido la **varicela previamente**? ☐ Si ☐ No

En caso afirmativo: ¿con qué edad la padeció? _____

IMPORTANTE: Para proceder a la vacunación es necesaria su autorización, siendo imprescindible su firma. Una vez firmado, mande este impreso al centro escolar cuando se le indiquen.

Marque en la casilla correspondiente si está de acuerdo con la vacunación de su hijo/a.

D. /D.ª: _____ DNI: _____

Actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor de: _____

Deseo que vacunen a mi hijo/a con las vacunas recomendadas en su calendario vacunal. ☐ Si ☐ No

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

En _____ a ____ de ____ del 2026

ESPACIO RESERVADO PARA EL PERSONAL SANITARIO

No vacunado: Por contraindicación ☐ Por negativa ☐ Por ausencia ☐ Otros ☐

Si el alumno/alumna es mutualista (MUFACE, MUGEJU o ISFAS) y su proveedor de asistencia sanitaria es privado, deberá vacunarse en los centros de vacunación autorizados de sus respectivas entidades. Sólo podrán vacunarse en el aula, si el consentimiento informado va acompañado con una autorización de la entidad concertada que presta la asistencia sanitaria. Debe indicar que entidad le ha dado la autorización:

Adeslas ☐ Asisa ☐ Sanitas ☐ Otros (especificar) ☐